

— =Calado

Medidas:
Ancho 10cm x
Largo 20 cm

Pantone:
Azul 2758
#001E62

Alerdif

ANTI-HISTAMÍNICO

Cetirizina 10mg

Cápsula Blanda

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

COMPOSICIÓN

Cada 01 cápsula blanda contiene:

Cetirizina.....10 mg
Excipientes..... c.s.p.

1. ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Este medicamento se utiliza para aliviar los síntomas de la fiebre del heno y otras afecciones alérgicas, como alergias a mascotas o polvo y reacciones cutáneas.

2. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Alerdif 10 mg cápsulas blandas son un medicamento que se utiliza para aliviar los síntomas de la fiebre del heno y otras afecciones alérgicas como alergias a mascotas o polvo. Las cápsulas contienen 10mg de dihidrocloruro de cetirizina que es un antihistamínico que ayuda a aliviar los síntomas de la alergia como estornudos, senos paranasales y ojos llorosos. También se puede utilizar para tratar reacciones alérgicas en la piel. Estos incluyen urticaria, también conocida como urticaria, donde la piel se ve manchada, con ronchas blancas elevadas (protuberancias) rodeadas de enrojecimiento.

Este medicamento se utiliza en adultos y niños a partir de 12 años.

3. INFORMACIÓN PREVIA A LA TOMA DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

3.1 CONTRAINDICACIONES

Si alguna vez ha tenido una mala reacción al dihidrocloruro de cetirizina, a los derivados de la hidroxizina o la piperazina o a cualquier otro ingrediente de esta medicina.

Si tiene problemas renales moderados o graves. Alerdif 10 mg Cápsulas contienen aceite de soja. Si es alérgico al maní o a la soja, no utilice este medicamento.

3.2. PRECAUCIONES DE EMPLEO ADECUADAS

ANDREU

Desde 1866

Si usted es un paciente con enfermedad hepática y renal, por favor pregunte a su médico para que le aconseje; si es necesario, tomará una dosis más baja. Su médico determinará la nueva dosis. Si tiene dificultad para orinar, debe pedirle consejo a su médico.

3.3 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES

Consulte a su médico o farmacéutico.

Si usted es epiléptico o está en riesgo de convulsiones (ataques). Si esto se aplica a usted, consulte a un médico o farmacéutico. En la mayoría de las personas, este producto no produce somnolencia. Sin embargo, hay raras excepciones y usted debe tener cuidado cuando se utiliza este producto por primera vez. Si este producto le hace sentir somnoliento, no conduzca ni utilice maquinaria.

Embarazo/ lactancia

Si está embarazada o amamantando, puede estar embarazada o está planeando tener un bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

No debe tomar Alerdif 10 mg Cápsulas durante la lactancia porque la cetirizina pasa a la leche materna.

Reacciones adversas

En la mayoría de las personas, este producto no produce somnolencia. Sin embargo, hay raras excepciones y usted debe tener cuidado cuando se utiliza este producto por primera vez. Si este producto le hace sentir somnoliento, no conduzca ni utilice maquinaria.

Posibles efectos secundarios:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar este medicamento y busque ayuda médica inmediata:

- Signos repentinos de alergia como erupción cutánea, picazón o urticaria en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo, la brevedad de respiración, sibilancias
- o dificultad para respirar.
- Hematomas o sangrados más fácilmente de lo normal.
- Convulsiones (ataques) o alucinaciones
- Pérdida del conocimiento.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar este medicamento y consulte a su médico:

- Confusión
- Pruebas anormales de la función hepática

- Latidos cardíacos rápidos
- Otros efectos que pueden ocurrir incluyen:
- Común: afecta de 1 a 10 usuarios de cada 100
- Dolor de cabeza o mareos
- Somnolencia o cansancio
- Inquietud
- Boca seca, dolor de garganta, malestar estomacal, dolor abdominal, diarrea, náuseas y rinorrea.

Poco frecuentes: afecta de 1 a 10 de cada 1.000 usuarios

- Agitación
- Debilidad inusual
- Sensación de malestar general o inquietud
- hormigueo

Rara vez: afecta de 1 a 10 usuarios de cada 10.000

- Agresividad
- Depresión
- Aumento de peso
- Trastornos del movimiento incluyendo temblor, espasmo muscular y tics.
- Insomnio

Muy raramente: afecta a menos de 1 usuario en 10.000

- Trastorno del gusto
- Tos
- Visión borrosa, hinchazón de los ojos, trastorno del movimiento ocular.
- Micción difícil, dolorosa o involuntaria.

Desconocido

- Vértigo
- Aumento del apetito
- Amnesia
- Deterioro de la memoria
- Incapacidad para orinar
- Dolor ocular

En muy raras ocasiones:

Las personas han pensado en suicidarse y si se siente de esta manera, deje de tomar las cápsulas y consulte a su médico. También se han notificado casos de impotencia en adultos.

3.4 ADVERTENCIAS ESPECIALES

- Tener en cuenta ciertas categorías de los pacientes (niños, mujeres embarazadas, lactancia, deportistas, adultos mayores, etc).
- Efectos del tratamiento sobre la capacidad para conducir un vehículo o manipular determinadas máquinas.
- Incluir las advertencias relativas a los excipientes.

Si olvida tomar el medicamento:

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente dosis cuando sea necesario siempre que solo tome un máximo de 1 cápsula en 24 horas. No tome una dosis doble.

4. INSTRUCCIONES NECESARIAS Y

HABITUALES PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN:

4.1 DOSIS: 1 cápsula blanda.

4.2 FORMA FARMACÉUTICA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Cápsula blanda - Vía oral

4.3 FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN: Cada 24 horas.

4.4 RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA DE CONSULTAR AL MÉDICO O FARMACÉUTICO, SEGÚN PROCEDA, PARA CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO. Cuando la naturaleza del producto lo requiera. Precauciones durante su preparación y administración.

5.- REACCIONES ADVERSAS:

Notificación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

6.- INFORMACIÓN RELACIONADA A LA FECHA DE EXPIRA QUE FIGURA EN EL ENVASE:

No sobrepasar la fecha de vencimiento indicada en el envase.

7.-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

8.- ADVERTENCIAS A CIERTOS SIGNOS VISIBLE DE DETERIORO

Si observa algún signo visible de deterioro u observa que el empaque está abierto o dañado, no consumir el producto. Acuda a su farmacéutico.

9.-PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DEL PRODUCTO NO UTILIZADO Y DE TODOS LOS MATERIALES QUE HAN ESTADO EN CONTACTO CON ESTE.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Consulte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Fabricado para:

Doctor Andreu Q.F.S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134 | Torre 1, Of. 708 Urb. Club Golf los Incas, Santiago de Surco. Lima 33 – Perú.
Tfo: 01 637 7373

ANDREU

Desde 1866

Doctor Andreu Q.F.S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134 | Torre 1, Of. 708 Urb. Club Golf los Incas, Santiago de Surco. Lima 33 – Perú.
R.U.C. 27376816797

www.doctorandreu.com

